

## Hospitalizace ke zjištění tolerance a titraci tlaků při přetlakové léčbě (CPAP, BiPAP aj.)

V případě, že je pacientovi za pomoci polygrafie či polysomnografie prokázána středně či velmi pokročilá zástava dechu s výskytem zástav dechu ve spánku 15/hod. a více, vyzýváme jej k minimálně třínoční hospitalizaci, kdy přes noc zjišťujeme, zda je schopen tolerovat přetlakovou léčbu prostřednictvím přístroje CPAP, BiPAP či další vyšší třídy, jaký léčebný přístroj je pro pacienta vhodný vzhledem k charakteru jeho postižení, jaké léčebné tlaky se jeví vhodné k dostatečné eliminaci zástavy dechu ve spánku, eventuálně zda je v dostatečné míře eliminována i možná hyposaturace kyslíkem ve spánku a zda léčba přístrojem přináší subjektivní úlevu od projevů nemoci (poruchy přes denní bdělosti, zhoršená koncentrace apod.).

Příjem probíhá v domluveném čase v dopoledních hodinách neboť v této době je možno konzultovat specializovaného lékaře - somnologa. Pokud se u pacienta během hospitalizace prokáže dostatečná snášenlivost pro něj vhodného přístroje na přetlakovou léčbu při léčebných tlacích, jež eliminují zástavu dechu či hyposaturaci kyslíkem ve spánku, vyzýváme příslušnou zdravotní pojišťovnu ke schválení této léčby.

