

Otomikroskopie a paracentéza s případným odsátím tekutiny ze středouší nebo zavedením drenážní trubičky

Otomikroskopie je použití mikroskopu pro podrobné otologické vyšetření s případným operačním výkonem v oblasti zevního zvukovodu, bubínku a středouší.

Paracentéza je naříznutí bubínku. Poté následuje odsátí tekutiny ze středního ucha a případně i zavedení drenážní trubičky do bubínku. Výkon se provádí při onemocnění středního ucha a sluchové trubice, které se nazývá chronický serózní zánět středouší. K zákroku se přistupuje, pokud nebyla úspěšná konzervativní léčba spočívající v léčbě zánětů a alergických stavů v horních cestách dýchacích a v provádění tzv. politzerací.

Pokud konzervativní léčba nevede ke zlepšení sluchu v důsledku přetrvávající tekutiny ve středním uchu, tak může dojít k přechodu do chronického bakteriálního zánětu středouší. Navrhovaná operace se zavedením **ventilační trubičky** nahradí špatnou funkci sluchové trubice a umožní zhojení sliznice středního ucha a jeho normální vzdušnost. **Ventilační trubička** se v bubínku ponechává několik měsíců do normalizace funkce sluchové trubice a zpravidla se sama vyloučí.

Vzhledem k tomu, že ventilační trubička otvírá středouší do zevního zvukovodu, je nutno ucho od operace chránit před vniknutím tekutiny či dávat do zvukovodu při koupání chrániče.