

HERPES SIMPLEX VIRUS JAKO PŘÍČINA ÚMRTÍ DVOUTÝDENNÍHO NOVOROZENCE

Foralová M.

Nemocnice České Budějovice, a.s., Neonatologické oddělení, České Budějovice, Česká republika

Infekce viry herpes simplex (HSV) jsou v populaci velice časté. Séropozitivita dospělých činí pro HSV-1 okolo 70%, pro HSV-2 okolo 20%.

Incidence novorozenecké HSV infekce je však relativně nízká (0,1-0,29‰), přičemž převážná část je způsobena sérotypem HSV-2. Nejčastějším způsobem nákazy novorozence je intrapartální přenos z matky na dítě. V této věkové skupině se ovšem často jedná o závažné až fatální onemocnění spojené s vysokou mortalitou a postinfekční morbiditou. I proto je v současné době dostupný výborně zpracovaný postup pro diagnostiku a léčbu těhotných žen s genitálním herpesem, management porodu a následnou péči novorozence těchto matek.

V této práci je však prezentován případ dvoutýdenního chlapce s fulminantním průběhem infekce způsobené HSV-1. Zdrojem nákazy byla v tomto případě matka primoinfekcí HSV-1 v orolabiální oblasti.

Na základě této zkušenosti jsme se začali zabývat hledáním doporučeného postupu pro adekvátní zajištění dětí matek se suspektní či prokázanou herpetickou primoinfekcí jiné, než genitální oblasti. Tato otázka není v naší ani světové literatuře příliš řešena a dosud je za dostačující obecně považován tzv. bariérový přístup. Zároveň chceme upozornit na velice nízké povědomí široké veřejnosti o tom, jak nebezpečný pro novorozence může „obyčejný opar“ být.