

Receptář individuálně připravovaných léčivých přípravků pro ambulantní praxi

Verze:

1

Vydáno:

3.3.2025

Lékárna Nemocnice České Budějovice, a.s. připravila Receptář individuálně připravovaných léčivých přípravků pro ambulantní praxi.

Přípravky uvedené v tomto receptáři připravuje lékárna standardně. Lhůta pro jejich přípravu v návaznosti na lékařský předpis je kratší, v některých případech jsou připravovány do zásoby a mohou být vydány pacientovi obratem.

Přípravky neuvedené v tomto receptáři mohou mít delší dobu přípravy v závislosti na dostupnosti surovin a vytíženosti přípravny.

Pro snazší orientaci jsou předpisy rozčleněny podle lékové formy a cesty podání:

[Tekuté a pevné lékové formy k zevní aplikaci](#)

[Léčivé přípravky k vnitřnímu užití](#)

[Oční léčivé přípravky](#)

[Čípky, Globule](#)

[Polotuhé lékové formy ke kožnímu podání](#)

[Přípravky pro užití v dutině ústní](#)

Informace k aktuální dostupnosti surovin pro přípravu, k možnostem individuální přípravy jsou dostupné:

na telefonním čísle 387 87 3115, 387 87 3112

na emailové adrese lekpripravna@nemcb.cz

Individuálně připravované léčivé přípravky lékárna připravuje pouze v pracovní dny tj. pondělí – pátek 7.00 – 14.00.

Pro ověření možnosti přípravy a dohodnutí termínu vyzvednutí zhotovených léčiv mohou pacienti využít rezervační systém lékárny:

<https://www.nemcb.cz/prakticke-informace/lekarna-2/rezervace-leku-na-predpis-online/>

© Lékárna Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Autorský kolektiv: PharmDr. S. Víšková, Mgr. E. Bunešová, Mgr. M. Imberová, Mgr. M. Popková

Tato publikace je určena pro odbornou zdravotnickou veřejnost a pracovníky ve zdravotnictví vybraných oborů.

Názvy produktů, firem apod. použité v této publikaci mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno.

Postupy a příklady v této publikaci, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory žádné právní důsledky.

Tekuté a pevné léčivé přípravky k zevní aplikaci

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Povidoni iodinati solutio 2 % 300 g	Rp. Povidoni iodinati 6,0 g Natrii hydrogenofosphatis dodecahydric. 1,92 g Acidi citrici monohydrici 0,522 g Aquae purificatae ad 300,0 g M. f. sol. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	2 měsíce	plná úhrada	Přípravky obsahující jodovaný povidon jsou kontraindikovány při známé přecitlivělosti na jod, hypertyreóze, adenomu štítné žlázy, dermatitis herpetiformis Duhring, před léčbou nebo vyšetřením radioaktivním jodem
Ušní kapky s nystatinem	Rp. Nystatini 2mil UI Glyceroli 85% Aquae purificatae aa ad 20,0 g M. f. susp. D.S.	AURICULARIA	1 měsíc	plná úhrada	
Solutio aluminii acetico-tartarici 500g (Sol. Burrow)	Rp. Alumini acetotartratis solutio 500,0 g D. ad lag. D.S.	LIQUIDA CUTANEA, OROMUCOSALIA	3 měsíce	plná úhrada	
Acidi salicylici solutio ethanolica cum resorcinolo	Rp. Acidi salicylici 0,4 g Resorcinoli 0,4 g Aetheri solventis Ethanol 60% aa ad 200,0 g M. f. sol. D.S.	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	

Tekuté a pevné léčivé přípravky k zevní aplikaci

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Solutio ac.borici, natrii chlorati, natrii tetraboras decahydr. (Švýcary, Lurdy) 1000 g	Rp. Acidi borici 20,0 g Natrii chlorati 20,0 g Natrii tetraboratis decahydr. 10,0 g Aquae purificatae ad 1000,0 g M. f. sol. D.S. K obkladům	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	
Solutio Castellani sine fuchsino 100g	Rp. Sol. Castellani sine fuchsino 100,0 g D.S. seu Rp. Acidi borici 0,8 g Phenoli 3,6 g Resorcinoli 8,0 g Acetoni 4,0 g Ethanoli 96% 7,4 g Aquae purificatae ad 100,0 g M. f. sol. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	
Kolodium na bradavice 20g	Rp. Acidi lactici 4,0 g Acidi salicylici 4,0 g Aetheri solventis 4,0 g Ricini oleum virginale 0,2 g Collodii ad 20,0 g M. f. sol. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	

Tekuté a pevné léčivé přípravky k zevní aplikaci

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Acidi borici solutio ethanolica 3% 20g (ušní kapky)	Rp. Acidi borici 0,6 g Ethanoli 60% ad 20,0 g M. f. sol. D. S.	AURICULARIA	2 měsíce	plná úhrada	
Solutio Jarisch CL 2023 300 g	Rp. Sol. Jarisch 300,0 g M. f. sol. D. S. seu Rp. Acidi borici 2,0 g Glyceroli 85% 4,0 g Aquaе purificatae ad 300,0 g M. f. sol. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	3 měsíce, po prvním otevření	plná úhrada	Změna názvu Solutio Jarisch: Harmonizace s ČL 2023, pod názvem Sol.Jarisch je uveden roztok bez parabenů (dříve Sol.Jarisch sine parabenis) Používá se při zánětlivých onemocněních kůže na chronické záněty, akné, ekzémy. Přípravek není vhodný pro děti do 10 let z důvodu obsahu kyseliny borité. Tento přípravek neobsahuje žádné konzervační látky, proto je doporučeno po prvním otevření přípravek uchovávat při teplotě 2-8 °C a spotřebovat do 1 měsíce.
Clotrimazoli solutio (ušní kapky)	Rp. Clotrimazoli 0,1 g Helianthi ol. ad 10,0 g M. f. sol. D. S. 3-4x denně 2 kapky do ucha	AURICULARIA	1 měsíc	plná úhrada	
Clindamycini hydrochloridi solutio 10mg/ml 100 ml	Rp. Clindamycini hydrochl. 1,0 g Aquaе purificatad 25,5 g Propylenglycoli 10,4 g Ethanoli 96% 53,5 g M. f. sol. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	6 měsíců	plná úhrada	
Acidi borici et acidi salicylici solutio ethanolica cum resorcinolo , RSB lih	Rp. Resorcinoli 1,0 g Acidi salicylici 2,0 g Acidi borici 3,0 g Ethanoli 60% ad 100,0 g M. f. sol. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	

Tekuté a pevné léčivé přípravky k zevní aplikaci

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Solutio chloramphenicoli 3% 200g	Rp. Chloramphenicoli 6,0 g Aquae purificatae 30,0 g Ethanolli 60% ad 200,0 g M. f. sol. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	
Suspensio Višněvski cum balsamo peruviano 100g	Rp. Susp. Višněvski cum balsamo peruviano 100,0 g D. ad lag. D. S. seu Rp. Bismuthi tribromphenolatis 2,78 g Balsami peruviani 4,63 g Ricini ol. ad 100,0 g M. f. susp. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	3 měsíce	plná úhrada	
Ušní kapky glycerol, aqua, 10g	Rp. Glyceroli 85% Aquae purificatae aa ad 10,0 g M. f. sol. D. S.	AURICULARIA	1 měsíc	plná úhrada	
Acidi salicylici solutio oleosa 5% 100 g	Rp. Acidi salicylici 2,0 g Olivae olei raffinat. ad 100,0 g M. f. sol. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	Přípravek slouží k odstranění šupin ve vlasech, aplikuje se do vlasaté části hlavy obvykle 1x denně, nejlépe večer. Slunečnicový olej lze nahradit čistěným olivovým olejem. Přípravek se používá u dospělých a dětí starších 6 let, pro děti ve věku od 6 měsíců do 6 let se používá 1% koncentrace kyseliny salicylové. Tento roztok je možné připravit bez ricinového oleje.
Sulphuris suspensio cum ac.salicyl.	Rp. Acidi salicylici 2,0 g Sulphuris ad usum externum 5,0 g Aetheris solventis 30,0 g Ethanolli 60% ad 100,0 g M. f. susp. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	

Tekuté a pevné léčivé přípravky k zevní aplikaci

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Šampon s ichthamolem 200 g	Rp. Ichthammoli 6,0 g Acidi citrici monohydr. 1,4 g Aquae purificatae 32,6 g Spiritus saponis kalini ad 200,0 g M. f. sol. D. S. Nanést na kůži ve vlasech, pak spláchnout vodou	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	Ichthamol nahrazuje tinkturu z kamenouhelného dehtu, která byla původně obsažena v 10% koncentraci v šamponu a z důvodu podezření na karcinogenní účinky se již nepoužívá. Kyselina citronová snižuje pH šamponu na hodnotu kolem 8.
Acidi salicylici solutio oleosa 1% 100 g (děti od 6 měs do 6 let)	Rp. Acidi salicylici 1,0 g Helianthi olei ad 100,0 g M. f. sol. D. S. K odstranění šupin ve vlasech	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	Přípravek slouží k odstranění šupin ve vlasech, aplikuje se do vlasaté části hlavy obvykle 1× denně, nejlépe večer. Slunečnicový olej lze nahradit čištěným olivovým olejem.
Acidi salicylici solutio ethanolica (ČL2023)	Rp. Acidi salicylici 3,0 g Ethanolu 60% ad 100,0 g M. f. sol. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	2 měsíce	plná úhrada	
Iodi solutio glycerolica (ČL2023)	Rp. Iodi 1,0 g Kalii iodidi 10,0 g Aquae purificatae 10,0 g Glyceroli 85% ad 100,0 g M. f. sol. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	4 měsíce	plná úhrada	
Tetracyclini solutio ethanolica 3%	Rp. Tetracyclini hydrochlor. 3,0 g Ethanolu 60% ad 100,0 g M. f. sol. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	14 dní	plná úhrada	

Tekuté a pevné léčivé přípravky k zevní aplikaci

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Solutio ac.borici, natrii chlorati, natrii tetraboras decahydr. (Švýcary, Lurdy) 500 g	Rp. Acidi borici 10,0 g Natrii chlorati 10,0 g Natrii tetraboratis decahydr. 5,0 g Aquae purificatae ad 500,0 g M. f. sol. D. S. K obkladům	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	
Ethacridini lactas sol.1‰ 500 g (sterilní)	Rp. Ethacridini lactatis monohydr. 0,5 g Aquae purificatae ad 500,0 g M. f. sol. Sterilisetur! D. S.	LIQUIDA CUTANEA	6 měsíců (po otevření 24 hodin)	plná úhrada	
Ethacridini lactatis solutio ČL 2023(nesterilní)	Rp. Ethacridini lactatis monohydr. 0,1 g Aquae purificatae ad 100,0 g M. f. sol. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	6 měsíců	plná úhrada	
Methylrosanilini chlor.solutio aquosa 1% 20 g	Rp. Sol. methylrosanilinium chlor. 1% aquosa 20,0 g M. f. sol. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	1 rok	plná úhrada	
Novikov solutio 20 g	Rp. Sol. Novikov 20,0 g M. f. sol. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	3 měsíce	plná úhrada	Přípravek má antiseptické a adstringentní účinky, používá se jako tekutý obvaz na drobnější poranění a neinfikované rány. Po aplikaci na kůži vytváří pro vodu a mikroorganismy nepropustný film, který chrání ránu a okolí před zevním prostředím.
Kalii permanganas 5 g	Rp. Kalii permanganas 5,0 g D. S.	PULVIS PRO LIQUIDA CUTANEA	6 měsíců	plná úhrada	

Tekuté a pevné léčivé přípravky k zevní aplikaci

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Ethanolum cum benzino denaturata 160 g	Rp. Ethanol cum benzino denaturata 160 g D. S. K desinfekci	LIQUIDA CUTANEA	6 měsíců	plná úhrada	
Solutio Jarisch cum parabenis CL 2023 300 g	Rp. Acidi borici 6,0 g Glyceroli 85% 12,0 g Aquae conservantis ad 300,0 g M. f. sol. D. S. seu Rp. Solutio Jarisch c. parabenis CL 2023 300,0 g D. S.	LIQUIDA CUTANEA	12 měsíců	plná úhrada	Používá se při zánětlivých onemocněních kůže na chronické záněty, akné, ekzémy. Přípravek není vhodný pro děti do 10 let z důvodu obsahu kyseliny borité. Tento přípravek obsahuje parabeny v konzervační vodě. Pro citlivou alergickou pleť je vhodnější varianta bez parabenů.
Ciclopiroxolamini solutio 1% 20g	Rp. Ciclopiroxi olamini 0,2 g Macrogoli 300 5,0 g Ethanolum 60% ad 20,0 g D. S.	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	Náhrada za výpadekový HVLP Batrafen sol.
Dimethylis sulfoxidi sol. 50% 100g	Rp. Dimethylis sulfoxidi 50,0 g Aquae purificatae ad 100,0 g M. f. sol. D. ad lag. pro aerodisp. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	6 měsíců	plná úhrada	
Minoxidili et coffeini spuma 100 g	Rp. Minoxidili 5,0 g Coffeini 2,0 g Espumil ad 100,0 g M. f. sol. D. ad lag. dispensatorium D. S. 1-2x vetřít do pokožky hlavy	LIQUIDA CUTANEA	3 měsíce	plná úhrada	Pěna se používá v terapii alopecie, aplikuje se 1-2x denně a jemně vmasíruje do pokožky hlavy a neoplachuje se.

Tekuté a pevné léčivé přípravky k zevní aplikaci

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Coffeini et minoxidili et finasteridi solutio ethanolica 100 g	Rp. Coffeini 2,0 g Minoxidili 5,0 g Finasteridi 0,25 g Butylhydroxytolueni 0,055 g Glyceroli 85% 5,0 g Ethanolu 60% ad 100,0 g M. f. sol. D. ad vitrum aerodispersione D. S. 1-2x denně aplikovat na pokožku hlavy	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	Roztok se používá k léčbě androgenní alopecie, aplikuje se 1-2x denně.
Zinci oxidi suspensio 100 g	Rp. Zinci oxidi 25,0 g Talci 25,0 g Glyceroli 85% 25,0 g Silici colloidalis anhydrici 1,0 g Aquae conservans ad 100,0 g M. f. susp. D. S. Na postižená místa	LIQUIDA CUTANEA	6 měsíců	plná úhrada	
Zinci oxidi suspensio cum levomentholo 1% 100 g	Rp. Zinci oxidi 25,0 g Talci 25,0 g Glyceroli 85% 25,0 g Ethanolu 96% 3,0 g Silici colloidalis anhydrici 1,0 g Levomentholi 1,0 g Aquae purificatae ad 100,0 g M. f. susp. D. S. Několikrát denně potírat na postižená místa	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	V ČL 2017 je uvedena stejná receptura pouze s obsahem 0,3% levomentholu s dobou použitelnosti 6 měsíců. Koncentrace 0,3% je však k terapeutickému účinku (proti svědění) nedostatečná, proto byla zvýšena na obvykle používanou 1% koncentraci levomentholu.

Tekuté a pevné léčivé přípravky k zevní aplikaci

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Zinci oxidii suspensio cum dexamethasoni acetic 1% 100 g	Rp. Dexamethasoni ac. 0,01 g Zinci oxidii Talci Glyceroli 85% Silicii colloidalis anhydrici gel 3% aa ad 100,0 g M. f. susp. D. S.	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	
Šampon s ichthamolem 3% 100 g	Rp. Ichthammoli 3,0 g Acidi citrici monohydr. 0,7 g Aquae purificatae 16,3 g Spiritus saponis kalini ad 100,0 g M. f. sol. D. S. Nanést na kůži ve vlasech, pak spláchnout vodou	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	Ichthamol nahrazuje tinkturu z kamenouhelného dehtu, která byla původně obsažena v 10% koncentraci v šamponu a z důvodu podezření na karcinogenní účinky se již nepoužívá.
Šampon s bílým ichthamolem 3% 100 g	Rp. Ichthammoli albi 3,0 g Aquae purificatae 6,3 g Acidi citrici 0,7 g Spiritus saponis kalini ad 100,0 g M. f. sol. D. S. Nanést na kůži ve vlasech, pak spláchnout vodou	LIQUIDA CUTANEA	1 měsíc	plná úhrada	Bílý ichthamol podobně jako tmavý ichthamol nahrazuje tinkturu z kamenouhelného dehtu, která byla původně obsažena v 10% koncentraci v šamponu a z důvodu podezření na karcinogenní účinky se již nepoužívá. NRF uvádí stejné terapeutické koncentrace bílého i tmavého ichthamolu. Oproti tmavší variantě se lépe zapracovává do LF (nižší viskozita, vyšší rozpustnost ve vodě) a má vhodnější organoleptické vlastnosti pro pacienty.

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Omeprazoli suspensio 2 mg/ml 100 ml Syrspond ALKA	Rp. Omeprazoli 0,2 g SyrSpond® SF ALKA 6,3 g Aquae purificatae ad 100 ml M. f. susp. D. S.	LIQUIDA PERORALIA	2 měsíce, po prvním otevření 1 měsíc	plná úhrada	Podává se nalačno, většinou jednou denně v dávce 1 mg/kg při gastroesofageálním refluxu u dětí.
Propranololi hydrochloridi solutio cum natrii hydrogenophosphate (ČL 2023)	Rp. Propranololi hydrochloridi 0,20 g Acidi citrici monohydr. 0,85 g Natrii hydrogenophosphati dodecahydr. 0,70 g Natrii benzoici 0,05 g Sirupi simplicis 64,0 g Aquae pro inj. ad 114,0 g (100,0 ml) M. f. sol. D. S.	LIQUIDA PERORALIA	3 měsíce	plná úhrada	Přípravek se používá v pediatrii k systémové léčbě těžších forem dětských hemangiomů a v kardiologických indikacích. Obsahuje konzervační přísadu benzoan sodný a toto složení není vhodné pro novorozence. Pro novorozence do 1 měsíce lze připravit variantu bez benzoanu sodného s kratší dobou použitelnosti (14 dnů).
Propranololi hydrochloridi cps 0,01 g 100 cps.	Rp. Propranololi hydrochl. 0,01 g M. f. plv. D. ad cps. D. t. d. No C (centum) D. S.	PULVERES PERORALES	3 měsíce	plná úhrada	Propranolol patří mezi neselektivní betablokátory, dříve hodně používaný v kardiologii. Nyní se propranolol podává u dospělých především v neurologických indikacích (ke snížení třesu, úzkostných somatických symptomů a profylaxi migrény).
Propranololi hydrochloridi cps 0,02 g 100 cps.	Rp. Propranololi hydrochl. 0,02 g M. f. plv. D. ad cps. D. t. d. No C (centum) D. S.	PULVERES PERORALES	3 měsíce	plná úhrada	Propranolol patří mezi neselektivní betablokátory, dříve hodně používaný v kardiologii. Nyní se propranolol podává u dospělých především v neurologických indikacích (ke snížení třesu, úzkostných somatických symptomů a profylaxi migrény).
Propranololi hydrochloridi cps 0,04 g 100 cps.	Rp. Propranololi hydrochl. 0,04 g M. f. plv. D. ad cps. D. t. d. No C (centum) D. S.	PULVERES PERORALES	3 měsíce	plná úhrada	Propranolol patří mezi neselektivní betablokátory, dříve hodně používaný v kardiologii. Nyní se propranolol podává u dospělých především v neurologických indikacích (ke snížení třesu, úzkostných somatických symptomů a profylaxi migrény).

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Aqua carminativa rubra 200g	Rp. Aquae carminativae rubr. D. S. 200,0 g	LIQUIDA PERORALIA	3 měsíce	plná úhrada	

Oční léčivé přípravky

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Atropini sulfatis oculoguttae 0,01% 10 g	Rp. Atropinii sulfatis monohydrici 0,001 g Carbethopendecinii bromidi 0,002 g Natrii chloridi sol. 0,9% ad 10,0 g M. f. oculoguttae. Sterilisetur! D. S. 1 kapka na noc do oka	OCULARIA	3 měsíce, 1 měsíc po otevření!	plná úhrada	Použití v indikaci zpomalení progresu myopie u dětí, alternativa okluzoru v léčbě amblyopie (většinou koncentrace 0,02%).
Povidoni iodinati oculoguttae 0,5%	Rp. Povidoni iodinati 0,05 g Natrii chloridi 0,086 g Natrii hydrogenophosphatis dodecahydric 0,01 g Aquae pro inj. ad 10,0 g M. f. oculoguttae. Sterilisetur! D. S.	OCULARIA	2 měsíce, 7 dnů po otevření!	plná úhrada	Používají se jako lokální antiseptikum, k terapii virové konjunktivitidy. Přípravek je nevhodný pro pacienty s manifestním onemocněním štítné žlázy, při přecitlivělosti na jód a před a po terapii radioaktivním jodem. Během léčby nesmí být nošeny kontaktní čočky.
Homatropini hydrobromidi oculoguttae 2% (ČL 2023)	Rp. Homatropini hydrobromidi 0,2 g Natrii chloridi 0,057 g Carbethopendecinii bromidi 0,002 g Aquae pro inj. ad 10,0 g M. f. oculoguttae. Sterilisetur! D. S.	OCULARIA	3 měsíce, 1 měsíc po otevření!	plná úhrada	
Homatropini hydrobromidi oculoguttae euacida 4% (ČL 2023)	Rp. Homatropini hydrobromidi 0,4 g Natrii dihydrogenophosphas dihydrici 0,044 g Natrii hydrogenophosphas dodecahydrici 0,048 g Carbethopendecinii bromidi 0,002 g Aquae pro inj. ad 10,0 g M. f. oculoguttae. Sterilisetur! D. S.	OCULARIA	3 měsíce, 1 měsíc po otevření!	plná úhrada	

Oční léčivé přípravky

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Atropini sulfatis oculoguttae 0,02% 10 g	Rp. Atropinii sulfatis monohydrici 0,002 g Carbethopendecinii bromidi 0,002 g Natrii chloridi sol. 0,9% ad 10,0 g M. f. oculoguttae. Sterilisetur! D. S.	OCULARIA	3 měsíce, 1 měsíc po otevření!	plná úhrada	Použití v indikaci zpomalení progresu myopie u dětí, alternativa okluzoru v léčbě amblyopie (většinou koncentrace 0,02%).

Čípky, Globule

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Bisacodyli supp. 0,010 g No X	Rp. Bisacodyli Adeps solidus q.s. D. t. d. No X (decem) M. f. supp. D. S. 0,01 g	RECTALIA	3 měsíce	plná úhrada	
Bisacodyli supp. 0,015 g No X	Rp. Bisacodyli Massae ad supp. q.s. D. t. d. No X (decem) M. f. supp. D. S. 0,015 g	RECTALIA	3 měsíce	plná úhrada	
Metronidazoli 0,25 g cum prednisoni 0,01 g supp. No X	Rp. Metronidazoli Prednisoni Massae ad supp. q.s. D. t. d. No X (decem) M. f. supp. D. S. 0,25 g 0,01 g	RECTALIA	3 měsíce	plná úhrada	
Domperidoni 10 mg supp. No X	Rp. Domperidoni Massae ad supp. q.s. D. t. d. No X (decem) M. f. supp. D. S. 0,01 g	RECTALIA	3 měsíce	plná úhrada	Jedinou registrovanou indikací domperidonu je úleva od symptomů nauzey a zvracení u dospělých a dospívajících starších 12 let s hmotností vyšší než 35 kg, viz upozornění SÚKL na kardiovaskulární nežádoucí účinky. Omezené indikace a kontraindikací souvisejících se závažnými nežádoucími kardiovaskulárními účinky(sukl.cz). Užívat co nejkratší možnou dobu, max. týden. Původně vyráběné Motilium Children supp. 30 mg byly určeny pro děti od 6 let jednorázově při zvracení.
Domperidoni 30 mg supp. No X	Rp. Domperidoni Massae ad supp. q.s. D. t. d. No X (decem) M. f. supp. D. S. 0,03 g	RECTALIA	3 měsíce	plná úhrada	Jedinou registrovanou indikací domperidonu je úleva od symptomů nauzey a zvracení u dospělých a dospívajících starších 12 let s hmotností vyšší než 35 kg, viz upozornění SÚKL na kardiovaskulární nežádoucí účinky. Omezené indikace a kontraindikací souvisejících se závažnými nežádoucími kardiovaskulárními účinky(sukl.cz). Užívat co nejkratší možnou dobu, max. týden. Původně vyráběné Motilium Children supp. 30 mg byly určeny pro děti od 6 let jednorázově při zvracení.

Čípky, Globule

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Chloramphenicoli globulus 0,5 g No X	Rp. Chloramphenicoli 5,0 g Natr. tetraborici 5,0 g Acidi borici 1,0 g Glycerogelati gelatinae q.s. Div. In dos. No. X (decem) M. f. glob. D. S.	VAGINALIA	3 měsíce	plná úhrada	

Polotuhé lékové formy ke kožnímu podání

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Dexamethasoni ac. 0,01% cum Vaselino fl. ung.100 g	Rp. Dexamethasoni acetatis Vaselini fl. M. f. ung. D. S. 0,01 g ad 100,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	
Dexamethasoni 0,01% cum Vaselino fl. ung200 g	Rp. Dexamethasoni acetatis Vaselini fl. M. f. ung. D. S. 0,02 g ad 200,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	
Dexamethasoni 0,01% cum Ambiderman cremor 100 g	Rp. Dexamethasoni acetatis Ambidermani M. f. crm. D. S. 0,01 g ad 100,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	
Dexamethasoni 0,01% cum Ambiderman cremor 200 g	Rp. Dexamethasoni acetatis Ambidermani M. f. crm. D. S. 0,02 g ad 200,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	
Chloramphenicoli 3% cum Vaselino fl. ung100 g	Rp. Chloramphenicoli Vaselini flavi M. f. ung. D. S. 3,00 g ad 100,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	
Ciclopiroxi olamini cum Locoid cremor 50 g	Rp. Ciclopiroxi olamini Cremor basalis Locoid crm. Exp. originales No I M. f. crm. D. S. 0,20 g 19,8 g 30,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	

Polotuhé lékové formy ke kožnímu podání

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Polyemulsan (polysan cum oleo helianthi) 100 g	Rp. Polyemulsani D. S. 100,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	3 měsíce	plná úhrada	
Leniens ung 100 g	Rp. Ung. Leniens D. S. 100,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	3 měsíce	plná úhrada	
Hydrocortisoni ac., cinchocaini cremor 20 g	Rp. Hydrocortisoni acetatis Cinchocaini hydrochloridi Cremor basalis M. f. crm. D. S. 0,1 g 0,1 g ad 20,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	
Acidi borici unguentum 3% 100 g	Rp. Ung. Acidi borici 3% D. S. 100,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	3 měsíce	plná úhrada	
Ciclopiroxi olamini cremor 50g	Rp. Ciclopiroxi olamini Acidi citrici Cremor basalis M. f. crm. D. S. 0,5 g 0,2 g ad 50,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	Náhrada za Batrafen krém v době výpadku.
Dexamethasoni 0,01% cum Ung. simplex ung. 100 g	Rp. Dexamethasoni acetatis Ung. Simplicis M. f. ung. D. S. 0,01 g ad 100,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	

Polotuhé lékové formy ke kožnímu podání

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Ac. Salicylici, urea cum Syndermani ung 100 g	Rp. Acidi salicylici 15,0 g Urea 20,0 g Syndermani ad 100,0 g M. f. ung. D. S.	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	
Argenti sulfathiazoli ung. 100 g (Ung.Fox)	Rp. Ung. Argentici sulfathiazoli 2% 100,0 g D. S.	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	3 měsíce	plná úhrada	
Septonexi cum Locoid ung. 100 g	Rp. Carbethopendecini bromati 0,2 g Locoid ung. exp. originales No. II(duas) Vaselini albi ad 100,0 g M. f. ung. D. S.	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	
Beloderm cum Leniens ung. 100 g	Rp. Beloderm ung. exp. originales No. I Ung. Leniens ad 100,0 g M. f. ung. D. S.	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	částečná úhrada, doplatek za HVLP	
Beloderm cum Ambidermani cremor 150 g	Rp. Beloderm crm. exp. originales No. II Ambidermani ad 150,0 g M. f. ung. D. S.	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	částečná úhrada, doplatek za HVLP	
Mometasoni 0,05% cum Vaselini albi ung. 150 g	Rp. Mometasoni furoas 0,075 g Carbethopendecinium bromatum 0,24 g Vaselini albi ad 150,0 g M. f. ung. D. S.	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	

Polotuhé lékové formy ke kožnímu podání

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Vaselinum album 100 g	Rp. Vaselinum album D. S. 100,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	6 měsíců	plná úhrada	
Diprosone cum Infadolani ung. 120 g	Rp. Diprosone ung. exp. originales No. II Infadolan ung. exp. originales No. II M. f. ung. D. S.	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	částečná úhrada	
Tetracyclini 3% cum Vaselini fl. ung. 100 g	Rp. Tetracyclini Vaselini fl. M. f. ung. D. S. 3,0 g ad 100,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	
Tetracyclini 3%, dexametasoni 0,01 %, Vaselini fl. ung. 100 g	Rp. Tetracyclini Dexametasoni Vaselini fl. M. f. ung. D. S. 3,0 g 0,01 g ad 100,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	
Whitfield ung.100 g(cum Vasel.fl.)	Rp. Acidi salicylici Acidi benzoici Vaselini fl. M. f. ung. D. S. 3,0 g 6,0 g ad 100,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	Whitfieldova mast v originální receptuře obsahuje místo žluté vaseliny tuk z ovčí vlny(Adeps lanae). Český lékopis pod stejným názvem uvádí recepturu s obsahem 5 % kyseliny salicylové a 12 % kyseliny benzoové, což je zavádějící.
Phenoli camphorata ung.100 g	Rp. Sol. phenoli camphorata Vaselini fl. M. f. ung. D. S. 4,0 g ad 100,0 g	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	

Polotuhé lékové formy ke kožnímu podání

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Olivae oleum cum Ambiderman 300 g	Rp. Olivae oleum 30,0 g Ambidermani ad 300,0 g M. f. crm. D. S.	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	
Mometasoni 0,1% cum Cremor basalis cremor 300 g	Rp. Mometasoni furoas 0,3 g Carbethopendecini bromidi 0,6 g Cremor basalis ad 300,0 g M. f. crm. D. S.	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	
Miconazoli 0,5%, dexametasoni 0,01%, chloramphenicoli 1,5% cum Ambiderman cremor 100 g	Rp. Miconazoli 0,5 g Dexametasoni 0,01 g Chloramphenicoli 1,5 g Ambiderman ad 100,0 g M. f. crm. D. S.	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	
Clindamycini hydrochloridi gelatum 1% 100 g	Rp. Clindamycini hydrochloridi 1,0 g Natrii hydrogencarbonici 1,0 g Carbomeri 1,0 g Aquae purificatae ad 100,0 g M. f. gel D. S.	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	
Propranolol 1% cremor 30 g (Pentraven)	Rp. Propranololi hydrochloridi 0,3 g Pentraveni ad 30,0 g M. f. crm. (Da ad ollam unguator) D. S.	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc, při použití unguátorového kelímku použitelnost 3 měsíce	plná úhrada	K léčbě hemangiomu u dětí.
Lidocaini 5% cremor 30 g	Rp. Lidocaini 1,5 g Pentraveni ad 30,0 g M. f. crm. D. S.	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc, při použití unguátorového kelímku použitelnost 3 měsíce	plná úhrada	

Polotuhé lékové formy ke kožnímu podání

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Acidi borici 3%, zinci, talci 10% pasta 100 g	Rp. Acidi borici 3,0 g Talci 10,0 g Zinci oxydati 10,0 g Vaselini fl. ad 100,0 g M. f. Pastae D. S.	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc, při použití unguátorového kelímku použitelnost 3 měsíce	plná úhrada	
Ichthammoli, zinci, talci pasta 100 g	Rp. Ichthammoli 1,0 g Talci 10,0 g Zinci oxydati 10,0 g Vaselini fl. ad 100,0 g M. f. Pastae D. S.	PREPARATA SEMISOLIDA AD USUM CUTANEUM	1 měsíc	plná úhrada	

Přípravky pro užití v dutině ústní

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Fosfátový roztok A (ke kalciovému roztoku B)	Rp. Natrii dihydrogenphosphor. 0,234 g Natrii hydrogenphosphor. 1,615 g Aquae purificatae ad 300,0 g M. f. sol. D. S. 20 ml roztoku A smíchat s 20 ml roztoku B k výplachům	OROMUCOSALIA	1 měsíc	plná úhrada	Roztoky se smíchají před použitím.
Kalciový roztok B (k fosfátovému roztoku A)	Rp. Natrii chloridi 11,38 g Calcii chloridi cryst. 1,377 g Aquae purificatae ad 310,0 g M. f. sol. D. S. 20 ml roztoku A smíchat s 20 ml roztoku B k výplachům	OROMUCOSALIA	1 měsíc	plná úhrada	Roztoky se smíchají před použitím.
Nystatin suspensio glycerolica 50 tis.UI/ g 20g	Rp. Nystatin 1MIU Glycerolum 85% ad 20,0 g M. f. susp. D. S. Na postiženou sliznici nanášet 4-6x denně	OROMUCOSALIA	3 měsíce	plná úhrada	Nystatinová suspenze se používá především u kvasinkových infekcí v dutině ústní. Nystatin se prakticky nevstřebává z GIT, suspenzi lze podat i perorálně v prevenci propagace kvasinkové infekce do jícnu v dávce 5-10 ml. U novorozenců a nedonošenců není použití glycerolové suspenze nystatinu vhodné, protože je výrazně hypertonická a případným spolknutím by mohlo dojít k dráždění a dalšímu nežádoucímu působení na ještě nevyvinutý GIT (nekrotizující kolitida).
Chlorhexidini sol. 0,12% 1000g	Rp. Solutio chlorhexidini 0,12% 1000 g M. f. sol. D. S.	OROMUCOSALIA	6 měsíců	plná úhrada	
Formaldehydi Kutviti gargarisma (ČL2023) 20 g	Rp. Levomentholi 0,4 g Ratanhia tincturae 1,0 g Formaldehydi solutio 35% 2,0 g Ethanol 60% ad 20,0 g M. f. sol. D. S. 3x denně 20 kapek do 2dcl vody ke kloktání	OROMUCOSALIA	3 měsíce	plná úhrada	

Přípravky pro užití v dutině ústní

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Salia pro gargarismate pulvis ČL 2023 cum Menthae piperitae etherol.	Rp. Natrii benzoatis 5,0 g Natrii hydrogenocarbonatis 5,0 g Natrii chloridi 5,0 g Natrii peroxoboratis hydrici 5,0 g Menthae piper. etherolei 0,1 g M. f. plv. D. S. Půl čajové lžičky rozpustit ve sklenici vody, několikrát denně kloktat	OROMUCOSALIA	6 měsíců	plná úhrada	
Nystatini suspensio 100 000 IU/g	Rp. Nystatini 2 MIU Methycellulosi 1500 mPa.s 0,3 g Glyceroli 85% 0,6 g Aq. purif. ad 20,0 g M. f. gel. D. S. 3x denně na postižená místa sliznice dutiny ústní	OROMUCOSALIA	14 dnů	plná úhrada	Nystatinová suspenze se používá především u kvasinkových infekcí (soor, moučnivka) v dutině ústní. Je určena zejména pro novorozence a nedonošené děti. Nystatin se prakticky nevstřebává z GIT.
Dexpanthenoli solutio 5%, PANTHESOL (NRF)	Rp. Dexpanthenoli 5,0 g Natr. benz. 0,15 g Acidi citr. monohydr. 0,11 g Aq. purif. ad 100,0 g M. f. sol. D. S. K výplachům úst	OROMUCOSALIA	6 měsíců (NRF 7.3)	plná úhrada	
Dexpanthenoli solutio 2,5%, PANTHESOL	Rp. Dexpanthenoli 5,0 g Natr. benz. 0,3 g Acidi citr. monohydr. 0,2 g Xylitolu 8,0 g Glyceroli 85% 10,0 g Aq. purif. ad 200,0 g M. f. sol. D. S. K výplachům úst 3-4x denně, 10-15ml neředěného roztoku po dobu 1 minuty	OROMUCOSALIA	6 měsíců	plná úhrada	

Přípravky pro užití v dutině ústní

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Umělá slina s xylitolem XYLOSAL	Rp. Methylcellulosi 0,5 g Glyceroli 85% 5,0 g Xylitoli 5,0 g Natrii chlorati 0,5 g Aq. pro injectione ad 100,0 g M. f. Sol., Div. in dos. No II D. S. Ze sprejové lahvičky 1 dávku do úst dle pocitu sucha (D.S. z lahvičky s kapátkem podat několik kapek do úst dle pocitu sucha)	OROMUCOSALIA	1 měsíc ve sprejové lahvičce, 14 dnů v lékovce s kapátkem	plná úhrada	Xerostomie variabilní etiologie spojená se zvýšenou kazivostí chrupu.
Lidocaini hydrochloridi et dexpanthenoli solutio 100 g (NRF)	Rp. Lidocaini hydrochloridi monohydrici 1,0 g Dexpanthenoli 5,0 g Glyceroli 85% 3,0 g Aquae conservantis ad 100,0 g M. f. sol. D. S. K výplachům dutiny ústní	OROMUCOSALIA	6 měsíců (NRF 7.13)	plná úhrada	Roztok obsahuje lokální anestetikum lidokain a epitelizans dexpanthenol. Je určen k výplachům dutiny ústní nebo nanášení na bolestivé léze v dutině ústní, zvláště po chemoterapii nebo ozařování.
Lidocaini et dexamethasoni solutio 50 g (Kouzelná voda 50 g)	Rp. Lidocani hydrochloridi monohydr. 1,0 g Dexamethasoni natrii phosphatis 0,02 g Aluminium acetotartratis solutio 5,0 g Ethanolu 60% 10,0 g Methylcellulosi 1500 mPa.s 0,4 g Saccharini natrici 0,05 g Menthae piper. etherolei III gtt. Aquae purificatae ad 50,0 g M. f. sol. D. S.k vytírání dutiny ústní několikrát denně	OROMUCOSALIA	1 měsíc	plná úhrada	K znecitlivění sliznice dutiny ústní např. při aftech a stomatitidách. Není určeno pro děti.

Přípravky pro užití v dutině ústní

Název přípravku	Předpis pro lékaře	Léková forma	Doba použitelnosti	Úhrada pojišťovnou	Poznámka
Aluminii acetico-tartarici sol.500g (Sol. Burrow)	Sol.aluminii aceticotartarici 500,0 g	LIQUIDA CUTANEA, OROMUCOSALIA	3 měsíce	plná úhrada	
Procaini globulae orales	Rp. Procaini hydrochloridum Aqua purificatae Gelatinae Glyceroli 85% Sirupus simplex seu S. aurantii s.a. 0,04 g 0,6 g 0,4 g 2,0 g 1,5 g D.S.	OROMUCOSALIA	3 měsíce	plná úhrada	