

IMUNOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Č. pojištěnce:

ZP:

Datum narození:

Pohlaví:

Příjmení, jméno:

Oddělení/kontakt:

Tel.:

Dg.:

Odebral:

Datum a čas odběru:

Sérologie

- ☐ pertuse (IgM, IgG)
☐ tularémie
☐ brucelóza
☐ Yersinie
☐ Paul-Bunnellova reakce
☐ Widalova reakce
☐ EBV (VCA a EA)
☐ EBNA (IgM, IgG)
☐ HHV6 (IgM, IgG)
☐ lues screening (RRR, TPHA) *
☐ lues specifický (FTA IgM, IgG)
☐ tetanický toxin (IgG)
☐ QuantiFERON
(odběr do 4 spec.zk., k vyžádání v lab., NE před volným dnem)

Imunochemie

- ☐ IgA
☐ IgG
☐ IgM
☐ IgE (celkové)
☐ IgD
☐ IgG1-IgG4 podtřída
☐ C3 složka komplementu
☐ C4 složka komplementu *
☐ C1 inhibitor
☐ MBL
☐ funkční test aktivity komplementu
 klasická, lektinová, alternativní dráha
(doručit do lab. do 2h od odběru)
☐ CRP
☐ SAA
☐ ASLO
☐ cirk. imunokomplexy (CIK-PEG) *
☐ cirk. imunokomplexy vázající C1q
☐ alfa-1-antitrypsin
☐ orosomukoid
☐ alfa-2-makroglobulin
☐ transferin
☐ kryoglobuliny
(doručit do lab. do 1h od odběru při 37°C, srážlivá krev bez separačního gelu)
☐ ECP
(doručit do lab. do 1h od odběru, srážlivá krev bez separačního gelu)
☐ alfa-defensin (punktát)

Autoprotilátky

- ☐ ANA screening *
☐ DNA
☐ revmatoidní faktor
☐ p-ANCA, c-ANCA *
☐ myeloperoxidáza (p-ANCA ELISA)
☐ proteináza 3 (c-ANCA ELISA)
☐ ASCA
☐ ENA screening *
☐ CCP
☐ fosfolipázový receptor A2 (PLA2R),
 trombospondin (THSD7A)
☐ bazální membrána glomerulů (GBM)
☐ hladký sval
☐ mitochondrie
☐ parietální buňky *
☐ vnitřní faktor, H⁺/K⁺ATPáza
☐ příčně pruhovaný sval
☐ myokard
☐ reprodukční panel
 (thekální buňky, zóna pellucida, spermie)

- ☐ ENA panel (IgG)
☐ Jo-1 ☐ SS-A/Ro ☐ SS-B/La
☐ RNP ☐ Sm ☐ Scl-70

- ☐ ENA blot (IgG)
 (nukleosomy, dsDNA, histony, Sm, RNP68, Sm/RNP, SSA/Ro60, SSA/Ro52, SSB, Scl-70, RNA Polymerasa III, Ku, PM-Scl100, Mi-2, Jo-1, Cenp-A/B, PCNA, Ribosomal P, DFS-70)

- ☐ diabetes panel (IgG)
 (GAD 65, ICA, IA2)
☐ APCL panel (IgM, IgG)
 (kardiolipin, beta-2-glykoprotein, fosfatidylserin/protrombin, fosfatidylinositol)

- ☐ autoimunitní hepatitis blot (IgG)
 (M2 (mitochondrie), gp210, sp100, LKM-1, LC-1, SLA, F-aktin (hladký sval))

- ☐ autoimunitní myopatie blot (IgG)
 (Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, SRP-54, Mi-2, MDA-5, TIF1-gama, Ku, PM-Scl100, Scl-70, SSa/Ro52)

- ☐ autoim. perif. neuropatie blot (IgM, IgG)
 (gangliosidy, sulfatid)

- ☐ paraneoplastické autoprot. blot (IgG)
 (GAD65, SOX1, Ma2, Ma1, amphiphysin, CV2, Ri, YO, Hu)

Potravinové intolerance

- ☐ endomysium (IgA)
☐ transglutamináza (IgA)
☐ transglutamináza (IgG)
☐ deaminovaný gliadin (IgA, IgG)
☐ kravské mléko (IgA, IgG)
☐ histaminová intolerance
 DAO – koncentrace,
 funkční test degradace histaminu
(doručit do lab. do 24h od odběru)

Biologická léčba

- ☐ Infliximab ☐ inic. ☐ udrž.
☐ anti-Infliximab
☐ Adalimumab ☐ inic. ☐ udrž.
☐ anti-Adalimumab

Materiál:

Pokud není uvedeno jinak, odeberte srážlivou krev (červená vakueta).

* v případě pozitivního výsledku provádíme doplňující vyšetření

Razítko oddělení, jméno lékaře